


## COMPLETE LORIKEET

対象：ヒインコ・ゴシキセイガイインコ・オトメズグロインコ・ヨダレカケズグロインコなど



〈原材料〉  
粉砕穀物、シヨ糖、グルコース、乳清および大豆タンパク質、植物油、オメガ-3 およびオメガ-6 脂肪酸、リジン、メチオニン、マンナンオリゴ糖、β-グルカン、カロテノイド、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、ニコチンアミド、パントテン酸、ピオチン、葉酸、コリン、イノシトール、カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン  
〈成分〉  
粗タンパク質 13%、粗脂肪 6%、繊維質 3%、塩分 1%


給餌量 (1 日分) ※繁殖期は 30% 余分に与えてください。

鳥の体重	30g	60g	100g	140g	200g	260g
餌の量	5g	8g	12g	16g	20g	25g

ローリー&ロリキートの為の総合バランスフード (パウダー) です。乾燥したままお使い頂くか、適量の水またはお湯と混ぜてお使いください。食べ残しは毎日新しい餌に取り換えて下さい。

## Crumbles (フレークタイプ)

対象：オカメインコ、セキセイインコ、ラブバード、カナリア、フィンチ、ウズラ、ハト、など



〈原材料〉  
粉砕穀物、乳清および大豆タンパク質、肉類、マンナンオリゴ糖、β-グルカン、リジン、メチオニン、植物油、オメガ3 およびオメガ6 脂肪酸、カロテノイド、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、ニコチンアミド、パントテン酸、ピオチン、葉酸、コリン、イノシトール、カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン  
〈成分〉  
粗タンパク質 15%、繊維質 7%、粗脂肪 5%、塩分 1%


給餌量 (1 日分) ※繁殖期は 50% 余分に与えてください。

鳥の体重 (参考サイズ)	10 ~ 30g (カナリア・フィンチ)	30 ~ 70g (セキセイ・ボタ)	80 ~ 120g (オカメ・オウム)	25 ~ 70g (うずら小・はと小)	120 ~ 150g (うずら大・はと大)
餌の量 (小さじ)	2 ~ 4g 約 1/2 ~ 1 杯	4 ~ 8g 約 1 ~ 2 杯	12 ~ 16g 約 3 ~ 4 杯	4 ~ 8g 約 1 ~ 2 杯	16 ~ 20g 約 4 ~ 5 杯

このペレットは完全食です。サプリやおやつを減らし、代わりに果物、野菜などを全体の 20% 程度与えるといいでしょう。

## Parrot pellets (ミディアム)

対象：オカメインコ、ワカケホンセイインコ、コムリア、マコウ、キバタン、コバタン、オウム類など



〈原材料〉  
粉砕穀物、乳清および大豆タンパク質、肉類、マンナンオリゴ糖、β-グルカン、リジン、メチオニン、植物油、オメガ3 およびオメガ6 脂肪酸、カロテノイド、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、ニコチンアミド、パントテン酸、ピオチン、葉酸、コリン、イノシトール、カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン  
〈成分〉  
粗タンパク質 15%、繊維質 7%、粗脂肪 5%、塩分 1%


給餌量 (1 日分) ※繁殖期は 50% 余分に与えてください。

鳥の体重 (参考サイズ)	80 ~ 120g (オカメインコ、小型オウム)	150 ~ 350g (中型オウム、はとなど)	400g ~ 1kg (大型オウム)
餌の量 (大きさ)	10 ~ 15g 約 1 ~ 1.5 杯	15 ~ 25g 約 1.5 ~ 2.5 杯	25 ~ 40g 約 2.5 ~ 4 杯

このペレットは完全食です。サプリやおやつを減らし、代わりに果物、野菜などを全体の 25% 程度与えるといいでしょう。

## Egg & Biscuit

対象：オカメインコ、セキセイインコ、ラブバード、カナリア、フィンチ、ウズラ、ハト、など



〈原材料〉  
加工穀物、全卵粉、乳清および大豆タンパク質、植物油、オメガ-3 およびオメガ-6 脂肪酸、リジン、メチオニン、タウリン、マンナンオリゴ糖、β-グルカン、カロテノイド、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、ニコチンアミド、パントテン酸、ピオチン、葉酸、コリン、イノシトール、カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン  
〈成分〉  
粗タンパク質 15%、粗脂肪 6%、繊維質 4%、塩分 1%

給餌量 (1 日分)

鳥の種類	繁殖期以外	繁殖 1 か月前	抱卵期	ヒナ
カナリア、フィンチ、セキセイ	週に 1 度、5g	週に 2 度、5g	毎日、適量	週に 3 度、5g
オウム、はと	週に 1 度、10g	週に 2 度、10g	毎日、適量	週に 3 度、10g

繁殖期や体調が気になる愛鳥のための栄養バランスフードです。本品 20g に対しぬるま湯小さじ 1 (10ml) を入れてペースト状ではなくそぼろ状にします。野菜や果物をと混ぜて与える場合には、本品 10g に対して野菜 20g を刻んで混ぜ、本品を湿らせるなどしっとりした状態にしてください。

## Budgie starter

対象：セキセイインコ



〈原材料〉  
加工穀類および野菜、パン粉、乳清および大豆タンパク質、マンナンオリゴ糖、β-グルカン、リジン、メチオニン、植物油、オメガ3 脂肪酸、オメガ6 脂肪酸、カロテノイド、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、B12、B12、B12、ニコチンアミド、パントテン酸、ピオチン、葉酸、コリン、イノシトール、カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン  
〈成分〉  
粗タンパク質 23%、粗脂肪 10%、繊維質 6%、塩分 1%

給餌量 (1 日分)

繁殖期以外	繁殖 1 か月前	抱卵期	ヒナ
週に 1 度、5g	週に 2 度、5g	毎日、適量	週に 3 度、5g

セキセイインコのための栄養バランスフードです。本品 20g に対しぬるま湯小さじ 1 (5ml) を入れてペースト状ではなくそぼろ状にします。野菜と混ぜて与える場合には、本品 10g に対して野菜 20g を刻んで混ぜ、本品を湿らせるなどしっとりした状態にしてください。

## Hand rearing food

(ヒナ用フォーミュラー・パウダー)

対象：全てのヒナ



〈原材料〉  
加工穀類、乳清および大豆タンパク質、グルコース、マルトデキストリン、植物油、オメガ-3 およびオメガ-6 脂肪酸、リジン、メチオニン、タウリン、マンナンオリゴ糖、β-グルカン、カロテノイド、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、ニコチンアミド、パントテン酸、ピオチン、葉酸、コリン、イノシトール、カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、セレン  
〈成分〉  
粗タンパク質 24%、粗脂肪 9%、繊維質 5%、塩分 1%

給餌量 (1 日分) ※体重の 10 ~ 20% を目安に与えてください。

生後	1 日目	2 ~ 5 日目	6 ~ 10 日目	11 ~ 15 日目	16 ~ 20 日目	21 日目 ~
7-ド：お湯	1 : 6	1 : 5	1 : 4	1 : 3	1 : 2	1 : 1

50℃のお湯に混ぜ、2分間待ちます。濃過ぎる場合は再加熱し水を加えて適度な硬さにします。36-38℃まで冷ましてスプーンまたはシリンジで与えます。生後まもなくは 1 日 6 回に分けて 与え、成長にしたがって 3~4 回に減らします。清潔な道具を使用し、毎回新鮮なものを与え、食べ残しはすべて廃棄してください。